


# おう吐物処理の手順



- ① 換気扇を回し、窓を開ける。
- ② 処理する人以外が近づかないようにする。
- ③ 処理する人は手袋、マスク、エプロン、フットカバーを着用する。



- ④ おう吐物はペーパータオルで外側から内側に向けてふき取る。



- ⑤ 使用したペーパータオルはビニール袋に入れ、0.1%次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、密閉して処分する。シューズカバー、外側の手袋を外す。



- ⑥ おう吐物が付着した床周囲をペーパータオルか新聞紙で覆い、0.1%次亜塩素酸ナトリウムを染み込ませる(半径2mの範囲で消毒)。10分後にペーパータオルを取り、水ぶきする。



- ⑦ 手袋・マスク、エプロンは廃棄。着衣は廃棄するか、0.02%次亜塩素酸ナトリウムに30分以上つけて消毒又は熱湯消毒し他の洗濯物と分けて洗う。手洗いを行う。1時間以上換気続ける。

## 消毒液の作り方

次亜塩素酸ナトリウム  
原液濃度6%の場合

### 嘔吐物、ふん便の処理 0.1%


500mlのペットボトル1本の水に  
原液9ml(ペットボトルキャップ2杯弱)

### 調理器具、ドアノブ、便座、床、衣類などの消毒 0.02%

2リットルのペットボトル1本の水に  
原液7ml(ペットボトルキャップ1杯半)


### 衣服など

85℃で1分間以上 熱湯消毒する



# おう吐物処理セット

- 手袋 2組
- マスク 1枚
- エプロン 1枚
- フットカバー 1組



1人分  
2人以上用意しておく  
すべて使い捨て

- ゴミ袋 2枚
- ペーパータオル
- 新聞紙

★物品は基本的には使い捨てです。  
ちりとりなどの再利用するものは使用後必ず消毒し（次亜塩素酸ナトリウム水溶液 0.02%）、完全に乾燥させてください。

- ちりとり(ビニールを被せておく)

- ガラスクリーナー



- バケツ

※ガラスクリーナー  
(または水切りワイパー、ガラスワイパー等)  
: 嘔吐物を集める時などに便利

- 消毒液（次亜塩素酸ナトリウム希釈液）